



بنام خداوند جان و خرد
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا
بخش آموزش به بیمار

راهنمای مصرف بریلاووس


شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	راهنمای مصرف بریلاووس
تهیه کننده	دفتر آموزش به بیمار
تأیید کننده	دکتر فاطمه جاویدی
سمت	پزشک داروساز
تاریخ تهیه/به روز رسانی	بهار ۱۴۰۵
ناظر کیفی	سوپروایزر ارتقاء سلامت
منبع/منابع	داروهای ژنریک
کد بروشور آموزشی	W-TP -122 R02

www.denahospital.com

شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، بیمارستان دنا
تلفن: ۳۶۴۹۰۴۱۱-۱۷ فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳
واحد پرستار پیگیر: داخلی ۲۶۳- ساعت ۱۳-۸

با اسکن لینک روبرو به بروشورهای
آموزشی دسترسی پیدا کنید.



نکات مهم حین مصرف داروی بریلاووس:

- ✓ در صورت ابتلا به تنگی نفس طولانی یا بی سابقه، قبل ادامه مصرف دارو پزشک خود را مطلع سازید
- ✓ در مدت درمان از مصرف الکل بپرهیزید
- ✓ طبق دستور پزشک سطح هموگلوبین و هماتوکریت بیمار بصورت دوره‌ای و منظم ارزیابی می شود (آزمایش خون)

Brilavus®
Ticagrelor

بریلوووس (تیکاگرلور)

قرص بریلوووس (Brilavus-Ticagrelor) به پیشگیری از بهم چسبیدن پالکت‌های خون و جلوگیری از ایجاد لخته کمک می‌کند و در نتیجه باعث جلوگیری از بروز سکته قلبی و مغزی می‌شود.

موارد مهمی که پیش از مصرف بریلوووس باید به پزشک اطلاع دهید:

- ✓ اگر به تازگی جراحی کرده‌اید یا به تازگی جراحی شدید داشته‌اید.
- ✓ اگر فعالیت‌های روزمره شما، شما را در معرض خطر جراحات بدنی قرار می‌دهند.
- ✓ در صورت داشتن اختلالات خونریزی دهنده.
- ✓ اگر به تازگی خونریزی معده یا روده داشته‌اید (مثل زخم معده یا پولیپ روده بزرگ)
- ✓ سابقه سکته مغزی، اختلالات ضربان قلب، مشکلات تنفسی یا ابتلا به آسم
- ✓ در صورت ابتلا به نقرس یا اسیداوریک بالا یا مشکلات کلیوی
- ✓ در صورت مصرف داروی رقیق کننده خون مثل وارفارین
- ✓ در صورت استفاده از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی مثل ایبوپروفن، سلوکسیب یا ناپروکسن

نکات ایمنی در خصوص مصرف بریلوووس:

- ✓ در صورت مصرف همزمان داروی آسپرین یا داروهای حاوی آسپرین حتما به پزشک خود اطلاع دهید
- ✓ مصرف تمام داروها (حتی داروهای گیاهی و مکمل‌ها) را به پزشک خود اطلاع دهید
- ✓ در صورت مصرف این دارو در زمان شیردهی، نوزاد نباید با شیر مادر تغذیه شود
- ✓ بدون نظر پزشک مصرف دارو را قطع نکنید
- ✓ دندانپزشک و پزشک خود را از مصرف داروی بریلوووس مطلع سازید
- ✓ در صورت داشتن جراحی ممکن است پزشک معالج شما دارو را برای چند روز قطع کند و سپس بعد از عمل جراحی با صلاحدید پزشک زمان مصرف دارو مشخص گردد
- ✓ در صورت داشتن خونریزی فعال، سابقه خونریزی مغزی، مشکلات کبدی شدید و یا حساسیت به دارو قبل از تجویز دارو توسط پزشک، پزشک خود را حتما در جریان قرار دهید
- ✓ برای کاهش احتمال بریدگی، کبودی یا جراحت هنگام کار با اشیاء تیز مانند تیغ، ناخنگیر احتیاط کنید و از فعالیت‌هایی مانند ورزش‌های تماسی خودداری کنید

نکات مهم حین مصرف داروی بریلوووس:

- ✓ می‌توانید دارو را همراه غذا یا بدون آن میل کنید
- ✓ دارو را طبق دستور پزشک و در زمان مشخص مصرف کنید
- ✓ اگر مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و نوبت بعدی را طبق برنامه مصرف کنید. از مصرف همزمان دو قرص برای جبران دوز فراموش شده پرهیز کنید
- ✓ تا زمان تعیین شده توسط پزشک مصرف دارو ادامه دهید
- ✓ این دارو در کنار مزیت‌هایی که برای شما دارد، احتمال خونریزی را افزایش می‌دهد و ممکن است نیاز به پیگیری از طریق مراکز درمانی باشد و نیز شاید خونریزی دیرتر از حد معمول متوقف می‌شود
- ✓ استفاده از این دارو ممکن است منجر به تنگی نفس شود، این عارضه بیشتر در حالت استراحت رخ می‌دهد و در بیشتر موارد خودبخود بهبود می‌یابد