



بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

حاملگی نا بجا

شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	حاملگی نابجا
تهیه کننده	دفتر آموزش به بیمار
تأیید کننده	دکتر سرور
سمت	متخصص زنان
تاریخ تهیه/به روز رسانی	بهار ۱۴۰۵
ناظر کیفی	سوپروایزر ارتقاء سلامت
منبع/منابع	مامایی و بیماری های زنان دنفورث
کد بروشور آموزشی	W-TP-077 R02

www.denahospital.com

شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، بیمارستان دنا

تلفن: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۱۱ فاکس: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۳۳

واحد پرستار پیگیر: داخلی ۲۶۳- ساعت ۸-۱۳

با اسکن لینک روبرو به بروشورهای

آموزشی دسترسی پیدا کنید.



حاملگی خارج رحمی

نقاط احتمالی جنین در حاملگی خارج رحمی



مراقبتهای بعد از عمل جراحی:

- ✓ پس از ترخیص از خوردن غذاهای نفاخ پرهیز کنید.
- ✓ دستورات دارویی را طبق دستور مصرف کنید.
- ✓ در زمان گفته شده آزمایش BHCG تیترا را انجام دهید.
- ✓ در صورت تب بالای ۳۸ درجه، خونریزی شدید و یا تنگی نفس به اورژانس مراجعه کنید.
- ✓ از انجام کارهای سنگین بپرهیزید.
- در زمان گفته شده به مطب مراجعه کنید.



حاملگی نابجا :

اگر لانه گزینی در هر جایی به جز لایه داخلی رحم صورت بگیرد آن را حاملگی نابجا می‌نامند.

عواملی که باعث ایجاد حاملگی نابجا میشود:

- ✓ حاملگی نابجای قبلی: بعد از ابتلا یک مورد حاملگی نابجا احتمال ابتلا به حاملگی نابجای بعدی تقریباً ۱۰ درصد است.
- ✓ آسیب دیدگی قبلی لوله‌های رحم
- ✓ عقیم سازی لوله‌ای
- ✓ سابقه عفونت تناسلی
- ✓ استعمال دخانیات
- ✓ چسبندگی دور لوله‌ای (عفونت بعد از سقط اندومترئوز- التهاب آپاندیسیت)

علائم و نشانه ها:

- ✓ درد لگن و شکمی
- ✓ خون ریزی غیرطبیعی
- ✓ علائمی شبیه آپاندیسیت یا پیچ خوردگی تخمدان

راه های تشخیص:

- ✓ در مراحل اولیه حاملگی نابه جا که هنوز پارگی رخ نداده است حساسیت ناشایع است در صورت وقوع پارگی در هنگام معاینه شکمی و واژینال و در هنگام حرکت دادن سرویکس حساسیت بسیار شایع ایجاد می‌شود.
- ✓ علائم حیاتی در صورت خونریزی در ضمن پارگی لوله به صورت افت فشارخون و کاهش ضربان قلب می‌باشد.
- ✓ تیتر BHCG: که در ۱۰۰٪ موارد مثبت می‌شود.
- ✓ سونوگرافی: واژینال - شکمی
- ✓ لاپاراسکوپی- لاپاراتومی
- ✓ تغییرات نابجای پروژسترون سرم
- ✓ بهترین روش تشخیص سونوگرافی واژینال است



درمان:

- ✓ درمان طبی داروی متوترکسات
 - ✓ برداشتن لوله رحم
 - ✓ بازکردن لوله و خارج کردن توده و بخیه زدن محل
- بعد از درمان با صلاحدید پزشک باید تیتر BHCG انجام شود تا از برطرف شدن کامل حاملگی خارج رحمی اطمینان حاصل شود.

NO 
SMOKING