



بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

مراقبت‌های بعد از عمل ختنه

شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	مراقبت‌های بعد از عمل ختنه
تهیه کننده	دفتر آموزش به بیمار
تأیید کننده	دکتر بنانی
سمت	جراح عمومی
تاریخ تهیه/به روز رسانی	بهار ۱۴۰۵
منبع/مراجع	کتاب جراحی اطفال
ناظر کیفی	سوپروایزر ارتقاء سلامت
کد بروشور آموزشی	W-TP-069 R02

www.denahospital.com

شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، بیمارستان دنا

تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۹۰۴۱۱ فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳

واحد پرستار پیگیر: داخلی ۲۶۳- ساعت ۱۳-۸



اسکنر گوشی موبایل را بر روی کد روبرو
بگیرید تا به قسمت بروشورهای آموزشی
دسترسی پیدا کنید.



تغذیه بیمار بعد از ترخیص:

- ✓ در صورت بی‌حسی موضعی: غذا مانند قبل از عمل داده شود
- ✓ در صورت بی‌هو شی عمومی: غذا مایعات در حجم کمتر از حد معمول جهت رفع گرسنگی در روز اول هر ۳ تا ۴ ساعت داده شود
- غذا از روز دوم یعنی یک روز پس از عمل مانند قبل از عمل داده شود
- ✓ در صورت داشتن حالت تهوع قطره متوکلوپرامید هر شش ساعت قبل از غذا به مدت تا ۲ الی ۳ روز داده شود. تعداد قطرات به ازای هر کیلو وزن بدن یک قطره هر ۶ ساعت داده شود
- ✓ مراجعه به مطب ۶ تا ۷ روز پس از عمل می‌باشد

انجام اقدامات دارویی بعد از ترخیص :

۱. کودکان کمتر از ۵ ماه ، قطره استامینوفن هر ۶ ساعت (۴ قطره به ازای هر کیلو وزن بدن) داده شود.



۲. کودکان بالاتر از ۶ ماه ، شربت استامینوفن 0.5cc به ازای هر کیلو وزن بدن، هر ۶ ساعت داده شود.



۳. شربت هیدروکسی زین در صورت بی‌قراری، 0.5cc به ازای هر کیلو وزن بدن روزی دو الی سه بار داده شود.



۴. پماد ضد میکروب (جنتامایسین و یا موپیروسین) روزی دو بار در محل عمل به مدت پنج روز مالیده شود.



۵. پماد ویتامین A+D روزی دوبار در محل عمل از روز ششم به مدت پنج روز دیگر استفاده شود.



۶. در صورت باز کردن مجاری ادرار (عمل ماتاتومی) روزی دو بار با درجه زیر زبانی پماد درون مجرا مالیده شود.

۷. نظافت مقعد با گاز مرطوب تا سه روز پس از عمل (جهت پیشگیری از آلوده شدن زخم با میکروب مدفوع)

۸. استفاده از لگن آبگرم روزی دوبار به مدت ۳ دقیقه از روز چهارم الی ششم

