



بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

پلاویکس

شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	پلاویکس
تهیه کننده	دفتر آموزش به بیمار
تأیید کننده	دکتر فاطمه جاویدی
سمت	دکتر داروساز
تاریخ تهیه/به روز رسانی	بهار ۱۴۰۵
ناظر کیفی	سوپروایزر ارتقاء سلامت
منبع/منابع	داروهای ژنریک
کد بروشور آموزشی	W-TP-108 R02

www.denahospital.com

شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، بیمارستان دنا

تلفن: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۱۱ فاکس: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۳۳

واحد پرستار پیگیر: داخلی ۲۶۳- ساعت ۱۳-۸



با اسکن لینک روبرو به بروشورهای

آموزشی دسترسی پیدا کنید.

در صورت مشاهده موارد زیر، دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه کنید:

- ✓ مدفوع خونی یا تیره رنگ
- ✓ سرفه خونی
- ✓ وجود لکه‌های بنفش یا قرمز در پوست
- ✓ پوست رنگ پریده، ضعف، تب یا یرقان (زردی چشم و پوست)
- ✓ کبودی، خونریزی غیرمعمولی از دهان، واژن، بینی یا مقعد



در دوره مصرف پلاویکس، به این نکات توجه فرمائید:

- ✓ در صورت فراموش کردن دوز دارو، به محض اینکه دوز فراموش شده را به یاد آوردید آن را مصرف کنید. اگر تقریباً نزدیک به نوبت بعدی مصرف دارو است، از مصرف دوز فراموش شده خودداری کنید.
- ✓ برای جبران میزان داروی فراموش شده، از دو برابر کردن دوز بعدی جداً خودداری فرمائید.
- ✓ این دارو را می‌توان با یا بدون غذا مصرف کرد.
- ✓ مصرف پلاویکس با گریپ فروت و آب گریپ فروت تداخل شدیدی دارد و نباید به صورت همزمان مصرف گردد.
- ✓ در دوره مصرف پلاویکس، خوراکی‌هایی که باعث رقیق شدن خون می‌شوند، مانند سیر، زردچوبه، کلم بروکلی، زنجبیل، نعناع، آویشن، روغن زیتون و ... را با احتیاط مصرف کنید.
- ✓ در مصرف مکمل‌های ویتامین E دقت کنید و با پزشک خود مشورت کنید.
- ✓ در صورت مشاهده نشانه‌های واکنش آلرژیک (حساسیتی) به داروی پلاویکس مانند: راش پوستی، کهیر، اشکال در تنفس، تورم صورت، لب، زبان یا گلو با اورژانس پزشکی تماس بگیرید.

تعریف:

قرص پلاویکس (Plavix) که با نام های دیگری همچون قرص کلوپیدوگرل (clopidogrel) و قرص اسویکس (Osuix) شناخته می شود و به پیشگیری از به هم چسبیدن پلاکت های خون و جلوگیری از تشکیل لخته کمک می نماید. این دارو باعث می شود خون به راحتی در عروق شما جریان یافته و اکسیژن به ارگان های حیاتی مانند قلب و مغز برسد و نتیجه آن پیشگیری از بروز سکته قلبی و مغزی است. قرص پلاویکس بیشتر برای افراد با سابقه سکته و یا زمان انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی استفاده می شود.

موارد مصرف:

- ✓ ابتلا به تصلب شرایین
- (گرفتگی عروق)
- ✓ سکته قلبی
- ✓ انجام آنژیوگرافی یا
- آنژیوپلاستی
- ✓ سکته مغزی

نکاتی که باید قبل از استفاده از پلاویکس به آن توجه نمود:

- ✓ سابقه هر گونه خونریزی از جمله زخم فعال معده یا جراحی یا جراحی که در چند هفته اخیر داشته اید.
- ✓ سابقه اختلال کلیوی یا کبدی
- ✓ سابقه حساسیت به پلاویکس
- ✓ در صورت بارداری یا شیردهی
- ✓ وجود اختلالات خونی
- ✓ لیست داروهای مصرفی (حتی داروهای بدون نسخه، مکمل و گیاهی) را به همراه خود داشته باشید.
- ✓ سابقه سکته قلبی یا مغزی
- ✓ قصد انجام جراحی (جراحی دندان و)
- * حتماً پزشک خود را در جریان این اطلاعات قرار دهید تا اقدامات لازم انجام گردد.

در دوره مصرف به نکات زیر توجه فرمایید:

- ✓ دارو را دقیقاً همانطور که توسط پزشک شما تجویز می گردد مصرف کنید.
- ✓ داروی خود را به موقع و منظم مصرف کنید و از مصرف بیشتر یا کمتر از مقداری که پزشک تجویز کرده است خودداری کنید.

در دوره مصرف پلاویکس، به این نکات توجه فرمایید:

- ✓ در دوره مصرف این دارو مراقب هر گونه خونریزی در بدن خود باشید، مثل کار کردن با وسایل خطرناک که احتمال زخمی شدن دارد و حتی مسواک زدن که باعث خونریزی لثه می شود یا اصلاح کردن.
- ✓ قبل از انجام هر گونه عمل جراحی و یا دندانپزشکی، باید مصرف پلاویکس را قطع کنید. در صورتیکه عمل جراحی در پیش دارید، مصرف این دارو را به پزشک خود گرایش دهید.
- ✓ در صورتیکه در دوره مصرف پلاویکس، هر گونه ضربه ای به سر شما وارد گردید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. حتی اگر هیچ حس و علامت بدی در خود مشاهده نمی کنید.
- ✓ دارو را در دمای اتاق و دور از گرما و رطوبت نگهداری کنید. - اجتناب از انجام فعالیت هایی که ممکن است خطر خونریزی یا آسیب جدی را افزایش دهد.
- ✓ در صورت فراموش کردن دوز دارو، به محض اینکه دوز فراموش شده را به یاد آوردید آن را مصرف کنید. اگر تقریباً نزدیک به نوبت بعدی مصرف دارو است، از مصرف دوز فراموش شده خودداری کنید.