



بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

کور تاژ تشخیصی

شناسنامه بروشور آموزشی

عنوان	کور تاژ
تهیه کننده	دفتر آموزش به بیمار
تائید کننده	دکتر سرور
سمت	متخصص زنان
تاریخ تهیه/به روز رسانی	بهار ۱۴۰۵
ناظر کیفی	سوپروایزر ارتقاء سلامت
منبع / منابع	مامایی و بیماری های زنان دنفورث
کد بروشور آموزشی	W-TP-078 R02

www.denahospital.com

شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، بیمارستان دنا

تلفن: ۰۷۹-۳۶۴۹۰۴۱۱ فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳

واحد پرستار پیگیر: داخلی ۲۶۳- ساعت ۱۳-۸

با اسکن لینک روبرو به بروشورهای

آموزشی دسترسی پیدا کنید.



کورتاژ چیست:

کورتاژ تشخیصی یک روش تشخیصی_درمانی است که در موارد خونریزی‌های غیر طبیعی زنان کاربرد دارد. علل خونریزی‌های غیر طبیعی زنان عبارتند از:

- ✓ تومورهای بدخیم رحمی
- ✓ فیبروم‌های رحمی (تومورهای خوش خیم رحم)
- ✓ سقط جنین
- ✓ عدم تعادل هورمونی
- ✓ هیپرپلازی آندومتر (رشد بیش از حد لایه داخلی رحم)
- ✓ پولیپ‌های آندومتر

به طور طبیعی خانم‌ها در طول دوره باروری خود (۱۲-۱۳ سالگی تا ۵۰-۵۵ سالگی) هر ماه دچار خونریزی می‌شوند که این خونریزی طبیعی دوره‌ای، قاعدگی یا عادت ماهیانه نامیده می‌شود. در هر دوره قاعدگی قسمت اعظم لایه سطحی رحم ریزش کرده و مجدداً بدون هیچ گونه تغییری ساخته می‌شود.

برخی دلایل انجام کورتاژ:

- ✓ خونریزی‌های غیرطبیعی
- ✓ باقی ماندن بقایای جنینی یا جفت پس از سقط
- ✓ در حاملگی مولار
- ✓ برای بررسی بیشتر اختلالات دیده شده در تصویربرداری‌ها مانند پولیپ

آندومتر رحم، لایه ای است که تحت تأثیر هورمون‌های تخمدان از جمله استروژن و پروژسترون قرار می‌گیرد. سیکل قاعدگی طبیعی معمولاً فواصل ۲۸ الی ۲۹ روز دارد، ولی فواصل بین ۲۱ تا ۳۷ روز را هم می‌توان طبیعی حساب کرد. مدت خونریزی به طور طبیعی هفت روز است و مقدار خونریزی بین ۲۰ تا ۸۰ میلی لیتر می‌باشد. هرگونه تغییری در میزان و مدت خونریزی طبیعی ماهانه باید بررسی شود. در مواردی که در خونریزی‌های غیرطبیعی، اختلال در عملکرد هورمونی مطرح است ابتدا درمان طبی با استفاده از داروهای هورمونی صورت می‌گیرد و در صورت عدم پاسخ به دارو یا رد شرایط پاتولوژیک دیگر، کورتاژ تشخیصی توصیه می‌شود.



مراقبت های بعد از عمل:

- ✓ پس از یک عمل کورتاژ بیمار از لحاظ بروز خونریزی شدید بررسی می‌شود.
- ✓ اغلب خانم‌ها در روز عمل مرخص می‌شوند و برخی دیگر در فردای آن روز مرخص شده و فعالیت‌های طبیعی روزانه را می‌توان از سرگرفت.
- ✓ ورزش‌های خشن و سنگین را نبایستی انجام داد.
- ✓ مقاربت‌های جنسی را با مشورت پزشک میتوان از سرگرفت.
- ✓ سیکل قاعدگی به طور معمول به خاطر کورتاژ تغییر نمی‌یابد و همه خونریزی‌های واژینال ممکن است در عرض یک هفته تا ده روز خاتمه یابد.
- ✓ خونریزی تا هفت روز طبیعی است
- ✓ در صورت درد می‌توان از کپسول مفنامیک‌اسید و یا قرص استامینوفن کدئین استفاده کرد
- ✓ در صورت خونریزی شدید ترشحات چرکی و بد بو و تب بالای ۳۸ درجه باید به پزشک مراجعه کرد
- ✓ از فعالیت‌های سنگین تا سه ماه خودداری کرد